

تأثیر مکمل دهی آب چغندر بر برخی عوامل عملکردی در ورزشکاران: یک مقاله معرفی

محمد بابائی^۱، آمنه پور رحیم^۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۸/۲۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۴/۲۹

چکیده

هدف: مکمل غذایی آب چغندر (BRJ)، به عنوان منبع طبیعی سرشار از نیترات، مورد توجه ورزشکاران حرفه‌ای و تفریحی قرار گرفته است. نیترات و نیتریت، در داخل بدن انسان به نیتریک اکساید تبدیل می‌شود و با مکانیسم‌های مختلف بیوشیمیایی از جمله افزایش جریان خون و متابولیسم انرژی عملکرد ورزشکاران را ارتقاء می‌دهد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر مکمل دهی آب چغندر بر برخی از عوامل عملکردی در ورزشکاران است.

روش‌شناسی: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مکمل دهی آب چغندر بر برخی از عوامل عملکردی در ورزشکاران، مقالات علمی پژوهشی که در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ بودند را از پایگاه‌های علمی وب آو ساینس، گوگل اسکالر، پابمد و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی را تهیه و مورد مطالعه و بررسی قرار داده و نتیجه گیری می‌کند. جستجوی اولیه، شامل آب چغندر، بیت روت، نیتریت و نیترات بود. همچنین آزمودنی‌های مطالعات افراد سالم و ورزشکار بودند.

یافته‌ها: در مجموع، ۲۹ مطالعه با ۴۶۲ آزمودنی وارد مطالعه حاضر شدند. نتایج نشان داد مکمل دهی آب چغندر باعث افزایش معنی‌دار توان هوایی و بی‌هوایی، افزایش عملکرد و استقامت عضلانی، افزایش طرفیت آتنی اکسیدانی، کاهش معنی‌دار درک فشار، فشار خون و ضربان قلب در ورزشکاران می‌شود.

نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشاد داد که مکمل دهی آب چغندر به میزان ۱۴۰ میلی‌لیتر(۱۲۸ میلی‌مول نیترات) به صورت حد و مزمن باعث افزایش عوامل عملکردی در ورزشکاران می‌شود.

واژگان کلیدی: مکمل غذایی، آب چغندر، نیترات، توان هوایی و بی‌هوایی، عملکرد ورزشی.

✉ نویسنده مسئول:
M.Babaei9674@gmail.com

- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی،
دانشگاه محقق اردبیل اردبیل، ایران.

- گروه تربیت بدنی و علوم
ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان-
شناسی، دانشگاه محقق اردبیل اردبیل،
ایران.

ISSN:۲۹۸۰-۸۹۶۰

تمامی حقوق این مقاله برای نویسنگان محفوظ
است.

ارجاع دهی:

Babaei M, Pourrahim A. The Effect of Beetroot Juice Supplementation on some functional factors in Athletes: A review Article. **Research in Exercise Nutrition** 2025;2(4):33-47, Doi: <https://doi.org/10.22034/ren.2024.141763.1061>.

The Effect of Beetroot Juice Supplementation on some Functional factors in Athletes: A review Article

Mohammad Babaei^{1✉}, Ameneh Pourrahim²

Received: 2024/07/19

Accepted: 2024/11/11

Abstract

Aim: Beetroot juice (BRJ) dietary supplement, as a natural source rich of nitrates, has attracted the attention of professional and recreational athletes. Nitrate and nitrite are converted into nitric oxide inside the human body and improve the performance of athletes with various biochemical mechanisms, including increasing blood flow and energy metabolism. The purpose of this study is investigate the effect of beetroot juice supplementation on some functional factors in athletes.

Method: This study aims to investigate the effect of beetroot juice supplementation on some functional factors in athletes, scientific research articles that were in the period of 2016 to 2024 from the scientific databases of Web of Science, Google Scholar, PubMed and SID. It prepares, studies and examines and draws conclusion. The initial search included Beetroot juice, beetroot, nitrite and nitrate. Also, the study subjects were healthy people and athletes.

Results: In total, 29 studies with 462 subjects were included in the present study. The results showed that beetroot juice supplementation significantly increases aerobic and anaerobic power, increases muscle performance and endurance, increases antioxidant capacity, and significantly reduces pressure perception, blood pressure, and heart rate in athletes.

Conclusion: The present study showed that beetroot juice supplementation of 140 ml (12.8 mmol of nitrate) acutely and chronically increases functional factors in athletes.

Key words: Dietary supplement, beetroot juice, nitrate, aerobic and anaerobic power, sports performance.

^{1✉} Department of Sports Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

✉ Corresponding author:
M.Babaei9674@gmail.com

² Department of Sports Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

ISSN:2980-8960

All rights of this article are reserved for authors.

Citation:

Babaei M, Pourrahim A. The Effect of Beetroot Juice Supplementation on some functional factors in Athletes: A review Article. **Research in Exercise Nutrition** 2025;2(4):33-47, Doi: <https://doi.org/10.22034/ren.2024.141763.1061>.

فیزیولوژیکی به NO بیواکتیو در بافت‌ها و خون تبدیل شود (۱۷). NO یک مولکول پیام‌رسان است که توانایی بهبود عملکرد عروقی، کارابی میتوکندری و تنفس، هموستاز گلوکز و انتقال اضافات را دارا می‌باشد (۱۰). در طول انتقال اضافات اسکلتی، NO به عنوان گشاد کننده عروق عمل می‌کند و واکنش‌های فیزیولوژیکی را تحریک می‌کند و بر سینتیک اکسیژن تأثیر می‌گذارد. به خصوص، افزایش در دسترس بودن NO ممکن است با افزایش جریان خون به عضله فعال، به اکسیژن و تحويل مواد غذی کمک کند (۱۱). از نظر عملکرد متabolیکی، اعتقاد بر این است که NO جذب گلوکز و کارابی میتوکندری را در عضله بهبود می‌بخشد، در نتیجه هزینه آدنوزین تری فسفات (ATP) انتقالات عضلانی و هزینه اکسیژن را کاهش می‌دهد. از طریق این مسیر، مصرف چندر برای افزایش عملکرد در طول فعالیت‌های استقامتی، افجراخی و تناوبی توصیه شده است (۱۴-۱۲). علاوه بر این، مکمل دهی آب چندر تخلیه کراتین فسفات را در یک کار معین کاهش می‌دهد (۱۵). مکانیسمی که ممکن است تخلیه کراتین فسفات را به تأخیر اندازد، به بازسازی کراتین فسفات در طول تلاش‌های متناوب باشد بالا کمک می‌کند (۱۴). همچنین مکمل آب چندر ممکن است باعث افزایش سطح تنش و سرزندگی ذهنی در شروع ورزش شده (۱۶، ۱۴) و میزان فشار درک شده را کاهش دهد (۱۷). این امر با افزایش احتمالی پرفیوژن مغز یا کاهش تجمع متabolیت انجام می‌شود که باعث کاهش فعال شدن بازخورد اوران عضله III/IV به سیستم عصبی مرکزی و پتانسیل ایجاد خستگی مرکزی می‌شود (۱۷). عصاره چندر با ترشح بیشتر NO به خون و کاهش درک فشار فعالیت، حفظ انگیزه و جلوگیری از خستگی ادراری، بسیار کمک کننده باشد (۱۶، ۱۸، ۱۹). یک متابالیز نشان داد که مکمل NO₃- می‌تواند عملکرد استقامتی را بهبود بخشد (۱۲) و عملکرد شناختی را در طول ورزش‌هایی که نیاز به تصمیم گیری سریع و دقیق دارند، بهبود بخشد (۲۱، ۲۰). آب چندر به عنوان قدرت عضلانی را در تارهای تند انتقال افزایش داده و زمان واکنش را بهبود می‌بخشد (۲۲-۲۴). همچنین مشاهده شده است که ظرفیت آتنی اکسیدانی آب چندر بطور قابل توجهی نسبت به سایر نوشیدنی‌ها مانند آب گوجه، آب هویج، چای سبز و آب گیلاس و زغال اخته بیشتر است. این ظرفیت آتنی اکسیدانی بالا، تولید اکسیدان‌ها و متعاقباً آسیب‌های سلولی را مهار می‌کند (۲۵).

طبق دانش ما این شواهد جدید که تأثیر مکمل دهی آب چندر را بر عملکرد ورزشی ورزشکاران بررسی می‌کنند، به طور انتقادی ارزیابی نشده‌اند. بنابراین، در این مقاله، شواهد منتشر شده را مرور می‌کنیم تا مشخص کنیم که آیا مکمل دهی آب چندر بر عملکرد

مقدمه

دستیابی به اوج عملکرد در ورزش یک پدیده چند عاملی است که شامل ژنتیک، تغذیه، فیزیولوژی، بیومکانیک، روانشناسی، سلامت و علوم اجتماعی است. بدن انسان در حال ورزش مانند یک ماشین بیولوژیکی پیچیده است که به تعداد زیادی رویدادهای فیزیولوژیکی نیاز دارد تا همزمان اتفاق بیفتد. با این حال، تنها چند فرآیند فیزیولوژیکی عملکرد کلی فرد را در یک کار مشخص کنترل و محدود می‌کنند. بنابراین، ورزشکارانی که می‌خواهند عملکرد را به حداقل برسانند، باید درک اساسی از فرآیندهای فیزیولوژیکی که عملکرد را محدود می‌کنند، داشته باشند (۱). از دیدگاه فیزیولوژیکی، افزایش عملکرد در ورزش را می‌توان با سیستم‌های قلبی عروقی، عصبی، هورمونی و عضلانی برتر توضیح داد. مدل قلبی عروقی- بی‌هوایی، عملکرد حداقلی در ورزش را توصیف می‌کند که عملکرد را محدود می‌کنند، داشته باشند (۱). از قلبی تنفسی برای تحويل مقادیر زیادی خون اکسیژن دار به عضلات درگیر تعیین می‌شود. بنابراین، تمرین برای بهبود حداقل برداشت اکسیژن (VO_{2max})، برون ده قلبی، رگزایی در عضلات اسکلتی، توده و تراکم میتوکندری عملکرد استقامتی را افزایش می‌دهد (۲). بیشتر ورزش‌های تناوبی به افزایش و کاهش مکرر شتاب و سرعت نیاز دارند که عمدتاً توسط متabolیسم بی‌هوایی پشتیبانی می‌شوند. دستگاه هوایی در شدت‌های بالا مانند شدت‌های فراتر از آستانه لاكتات، در تأمین آدنوزین تری فسفات (ATP) ناکارآمد است. بنابراین، نیاز فوری برای ATP باید توسط فسفات‌های ذخیره شده و فرآیندهای بی‌هوایی (فسفارن و سیستم‌های گلیکولیتیک) برآورده شود. دستگاه هوایی در تسريع ریکاوری و بازسازی ATP در ورزش‌های تناوبی، نقش قابل توجهی دارد (۳، ۴).

امروزه علاوه بر تمرینات ورزشی استفاده از مکمل‌ها در جهت افزایش عملکرد و بهبود کارابی ورزشکاران، مورد استفاده قرار گرفته است (۵). آب چندر به عنوان یک مکمل، مورد استفاده ورزشکاران قرار می‌گیرد که حاوی نیترات غیر آلی (NO₃-) بالایی است و در سبزیجات بطور طبیعی یافت می‌شود (۶). هر لیتر آب چندر حاوی ۱۱/۴ گرم NO₃- است (۷). وقتی که NO₃- مصرف می‌شود، توسط باکتری‌های بی‌هوایی در حفره دهان توسط آنزیم نیترات ردوکتاز و سپس در معده به نیتریک اکساید (NO) کاهش می‌یابد (۸، ۹). هنگامی که نیتریت در محیط اسیدی معده قرار می‌گیرد، فوراً تجزیه می‌شود تا به NO و سایر اکسیدهای نیتروژن تبدیل شود که عملکرددهای فیزیولوژیکی تعیین کننده را انجام می‌دهند. نیترات و نیتریت باقیمانده از روده به گردش خون جذب می‌شوند، که می‌تواند تحت هیپوكسی

متن کامل مقالات وارد به مطالعه بررسی شدند. اطلاعات مربوط به کشور، نویسندها، آزمودنی‌ها، شاخص توده بدن (BMI)، سن، دوز و مدت مکمل دهی و نتایج مطالعات توسط نویسندها

ورزشی ورزشکاران تأثیر دارد یا خیر. امید است که اطلاعات ارائه شده برای فیزیولوژیست‌های ورزشی، مریبان و ورزشکاران ارزشمند باشد.

روش‌شناسی

این پژوهش یک مطالعه مروی نظاممند است که براساس دستورالعمل PRISMA در اردیبهشت، خرداد و تیر ماه ۱۴۰۳ انجام شد.

روش جستجو مقالات


از پایگاه مقالات SID و Scopus، Web of Science در بازه زمانی ۲۰۱۶-۲۰۲۴ در این مطالعه استفاده گردید. از کلمات انگلیسی: (“nitrate” OR “beetroot” OR “beetroot juice” OR “beetroot juice Supplementation”) and (“Athletic performance” OR “Sports performance” OR “aerobic power” OR “anaerobic power” OR “RPE” OR “Borg pressure perception index” OR “HR” OR “heart rate” OR “blood pressure” OR “Antioxidant defense” OR “MDA” OR “Malondialdehyde”). و از کلمات فارسی “مکمل دهی آب چغندر”，“نیترات”，“بیت روت”，“عملکرد ورزشی”，“توان هوایی”，“توان بیهوایی”，“شاخص درک فشار”，“ضریبان قلب”，“دفاع آنتی اکسیدانی”，“مالون دی آلدئید” برای جستجو مقالات استفاده شد.

معیارهای ورود و خروج از تحقیق

معیارهای انتخاب مقالات به پژوهش حاضر، شامل این موارد بودند: ۱- مقالات اصیل و علمی پژوهشی باشند. ۲- مقالات در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ باشند. ۳- آزمودنی‌ها به غیر آب چغندر، مکمل دیگری مصرف نکرده باشند. ۴- آزمودنی‌ها افراد سالم باشند. معیارهای خروج از تحقیق حاضر، شامل این موارد بودند: ۱- مقالات مروری باشند. ۲- استفاده از دو مکمل همزمان. ۳- استفاده از آزمودنی‌های بیمار. بعد از غربال گری مقالات، تعداد ۲۹ مقاله علمی پژوهشی برای مطالعه و بررسی وارد تحقیق حاضر شدند.

استخراج داده‌ها

جدول ۱: مطالعات وارد شده به تحقیق حاضر



شکل-۱: فلوچارت انتخاب مطالعات

باخته‌ها

باخته‌های مطالعه حاضر با ۲۹ مطالعه و ۴۶۲ آزمودنی تسان می- دهد مصرف آب چغندر در دوزهای ۱۴۰ میلی لیتر آب چغندر(۱۲۸ میلی‌مول⁻_{NO₃}) و بالاتر به صورت حاد و مزمن باعث افزایش معنی‌دار توان هوایی و بی‌هوایی، افزایش عملکرد و استقامت عضلانی، افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی، کاهش معنی‌دار درک فشار، فشار خون و ضربان قلب در ورزشکاران می‌شود.

ردیف	نویسنده اول و کشور	آزمودنی‌ها	سن(سال)	شاخص توده بدن	دوز و مدت مکمل‌دهی	نتایج
۱	سیناگا و همکاران ^۱ (۲۰۲۰) اندونزی (۱)	کنترل (n=۱۵) تجربی (دانشجو تربیت بدنسی) (n=۱۵)	۲۰-۲۲	ذکر نشده	۲۵۰ میلی لیتر آب چندنر، ۴ هفته	افزایش VO _{2max} کاهش TAC و MDA
۲	صالح و همکاران ^۲ (۲۰۲۰) مالزی (۲)	۱۲ دونده سرعت تمرين کرده	۱۳-۱۴	۱.۸۹±۱۸.۴۲	- کپسول نیترات (۴۴۰ میلی-مول) ۶۰ دقیقه قبل از تمرين، حاد	عدم تأثیر معنی‌دار بر عملکرد سرعتی
۳	کانگر و همکاران ^۳ آمریکا (۲۰۲۱)	۱۴ بازیکن مرد هاکی	۷.۵۵±۳۰.۸۶	۲.۴۱±۲۴.۷۸	- پودر بیت‌روت (۴۹۶ میلی-گرم) ۳ ساعت قبل تمرين، حاد	عدم تأثیر معنی‌دار بر عملکرد بی‌هوایی
۴	فرناندز و همکاران ^۴ اسپانیا (۲۰۱۸)	۱۲ دونده تخبه استقامتی در ۲ گروه ۶ نفری کنترل و تجربی	۵.۱±۲۶.۳	ذکر نشده	آب چندنر (۶.۵ میلی‌مول ۷-NO ₃ ⁻) روز ۱۵ میلی‌لیتر	کاهش معنی‌دار درک فشار، افزایش زمان واماندگی
۵	حسن پور و همکاران، ایران (۲۰۲۲)	۹ فرد تمرين کرده	۱.۳۳±۲۰.۴۴	۳.۲۷±۲۰.۵۵	۷۰ و ۱۴۰ میلی لیتر آب چندنر ۲ ساعت قبل تمرين، حاد	عدم تأثیر معنی‌دار بر توان بی‌هوایی، سرعت و چارکی
۶	خسروانیان و همکاران، ایران (۲۰۲۳)	کنترل (n=۶) تجربی (دوچرخه سوار) (n=۶)	۶.۳۳±۳۳.۳۲	۳.۰۵±۲۲.۸۴	۶۰ گرم مکمل چندنر (۴۰۰ میلی‌گرم نیترات)، ۷ روز	افزایش معنی‌دار توان بی‌هوایی اوج هوازی اوج
۷	کونکا و همکاران ^۵ اسپانیا (۲۰۱۸)	۱۵ مرد تمرين کرده مقاومتی	۱.۶±۲۲.۴	ذکر نشده	۷۰ میلی لیتر آب چندنر (۴.۶ میلی‌مول NO ₃ ⁻) حاد	افزایش معنی‌دار توان بی‌هوایی اوج و میانگین توان بی‌هوایی
۸	همتی‌نفر و همکاران، ایران (۲۰۲۳)	کنترل (n=۶) تجربی (n=۶)	۳±۲۶	۲.۵±۲۲.۳	۲۰۰ میلی لیتر آب چندنر (۴.۱ میلی‌مول NO ₃ ⁻) روز ۲	افزایش استقامت عضلانی استتا، کاهش درک درد عضلات، بهبود ریکاوری
۹	بهرنز و همکاران ^۶ آمریکا (۲۰۲۰)	۱۶ زن و مرد	۲۶±۶.۱ ۳۰±۶.۵	ذکر نشده	۷۰ میلی لیتر آب چندنر (۴.۶ میلی‌مول NO ₃ ⁻) حاد	بهبود اکسیژن مصرف زیر بیشینه، افزایش زمان واماندگی
۱۰	واکارو و همکاران ^۷ ایتالیا (۲۰۲۴)	مکمل (n=۳۳) دارونما (n=۱۱)	۱۲.۵±۳۲.۰۷	۱.۴±۲۲.۸	۴ فرق جویدنی بیت‌روت (۹۰ گرم در هر فرق) ۹۰ دقیقه قبل از آزمون، حاد	بهبود عملکرد شناختی و ظرفیت حافظه
۱۱	وابل و همکاران ^۸ انگلیس (۲۰۱۶)	۱۰ مرد ورزشکار تغیری	۱۲.۵±۲۱.۱	ذکر نشده	۷۰ میلی لیتر آب چندنر (۴.۱ میلی‌مول NO ₃ ⁻) روز ۵	افزایش معنی‌دار میانگین بروزه توانی
۱۲	فریک ^۹ آمریکا (۲۰۱۸)	۱۶ ورزشکار کراسفیت	ذکر نشده	ذکر نشده	۴۰۰ میلی گرم بودر بیت	افزایش معنی‌دار عملکرد

^۱ - Sinaga et al^۲ - Conger et al^۳ - Fernández et al^۴ - Cuenca et al^۵ - Behrens et al^۶ - Vaccaro et al^۷ - Wylie et al^۸ - Frick

بابایی و همکاران: تأثیر مکمل دهی آب چغندر بر برخی عوامل عملکردی در ورزشکاران...

ویژه در آزمون کراس فیت	روت، ۱۴ روز					
بهبود نیزی نولیدی در ضربات، عدم تغییر معنی-دار در کف شمار	۱۲۰ میلی لیتر آب چغندر، (۸۰۰ میلی گرم NO_3^-) حاد	1.75 ± 17.9	3 ± 21	۱۲ تکواندو کار تمرین کرده	میرآفتابی و همکاران، ایران (۱۳)(۲۰۲۳)	۱۳
کاهش ضربان قلب استراحت و بعد از فعالیت، کاهش در کف شمار و افزایش قدرت پایین تنه	آب چغندر (۴۵ میلی لیتر برای هر کیلوگرم وزن بدن)، حاد	ذکر نشده	ذکر نشده	(n=۱۰) مکمل (n=۱۰) دارونما	افشارنژاد و همکاران، ایران (۱۴)(۲۰۲۱)	۱۴
افزایش توان انفجاری و استقامت عضلانی پایین تنه	۷۰ میلی لیتر آب چغندر (۴۰۰ میلی گرم نیترات)، حاد	1.48 ± 20.97	3.97 ± 25.36	۱۴ زن فعال	جورادو و همکاران اسپانیا (۱۵)(۲۰۲۲) ^۱	۱۵
کاهش اکسیژن مصرفی زیر بیشینه، عدم تأثیر بر عملکرد سرعتی در هابیوکسی	۱۴۰ میلی لیتر آب چغندر (۱۳ میلی مول NO_3^-), حاد	ذکر نشده	2.5 ± 22.3	۱۲ مرد ورزشکار	کنت و همکاران ^۲ استرالیا (۱۶)(۲۰۱۹)	۱۶
افزایش میانگین سرعت	۴۲۰ میلی لیتر آب چغندر (۸.۴ میلی مول NO_3^-) روز	ذکر نشده	3 ± 28.2	۱۴ مرد دونده تفریحی	دی کاسترو و همکاران ^۳ برزیل (۱۷)(۲۰۱۹)	۱۷
افزایش اوج گشتاور بازکننده‌های زانو، افزایش سرعت زاویه‌ای، افزایش اوج قدرت عضلانی در انقباض ایزوکنیک، کاهش خستگی در طول انقباض	۱۴۰ میلی لیتر آب چغندر (۱۲۸ میلی مول NO_3^-) روز	ذکر نشده	1.5 ± 19.2	۱۲ تکواندو کار مرد	خسروی و همکاران، ایران (۱۸)(۲۰۲۱)	۱۸
افزایش توان بی‌هوایی اوج، کاهش زمان رسیدن به اوج، کاهش در کف شمار	۷۰ میلی لیتر آب چغندر (۶.۶ میلی مول NO_3^-)	ذکر نشده	ذکر نشده	۱۵ مرد تمرین کرده مقاومتی	پالبلو جوردا و همکاران ^۴ انگلیس (۲۰۱۹)	۱۹
افزایش توان بی‌هوایی، کاهش در کف شمار	روزانه ۲ بار (۱ میلی لیتر آب چغندر به ازای هر کیلوگرم وزن) ۶ هفته	ذکر نشده	$15-18$	تمرین (n=۱۰) تمرین مکمل (n=۱۰) مکمل (n=۱۰)، کنترل (n=۱۰)	آزالی علمداری، ایران (۲۰۲۳)	۲۰
افزایش توان بی‌هوایی، کاهش شاخص خستگی، بهبود چابکی	۱۰۰ میلی لیتر آب چغندر، حاد	2.69 ± 20.41	5.23 ± 24.5	۱۰ دختر کاراته کا	هاشمی‌فرد و همکاران، ایران (۲۱)(۲۰۲۲)	۲۱
افزایش توان بی‌هوایی میانگین و حداقل، کاهش شاخص خستگی، افزایش توان هوایی و عملکرد دویدن تناوبی شدید	۱۴۰ میلی لیتر آب چغندر، روز	0.48 ± 21.34	0.58 ± 20.50	۴۲ بازیکن فوتبالیست	همتی‌نفر و همکاران، ایران (۲۲)(۲۰۲۱)	۲۲

¹ - Jurado et al² - Kent et al³ - de Castro et al⁴ - Pablo Jodra et al

۲۳	دیالبیورا و همکاران ^۱ بزرگ (۲۰۲۰) (۲۳)	۱۴ رزمی کار تغیری	۸.۵۱±۲۹.۹۲	۲.۷±۲۶.۳۹	۱۰۰ گرم ژل میتنی بر بست روتو، حاد	بهبود قدرت گرفتن دست و ریکاوری قدرت، عدم تأثیر بر مولفه‌های برداشت اکسیژن
۲۴	- دیآلمیدیا و همکاران- شیلی ^۲ (۲۰۲۱) (۲۴)	۱۲ تکواندوکار	۸.۸±۲۶.۸	۳.۲±۲۵.۳	کپسول ۱۰۰ میلی گرمی بست روتو، حاد	افزایش توان هوایی اوج، افزایش $\text{VO}_{2\text{max}}$ در آستانه بی هوایی، بهبود عملکرد ویژه
۲۵	گارناچو و همکاران ^۳ آسپانیا (۲۰۲۰) (۲۵)	۱۲ مرد کراسفیت کار	۴.۳±۲۹.۵	ذکر نشده	۱۴۰ میلی لیتر آب چند روز (۱۲۸ میلی-مول NO_3^-) حاد	افزایش عملکرد، افزایش کورتیزول، افزایش اشباع اکسیژن و کاهش خستگی عضلانی
۲۶	ویکخام و همکاران ^۴ کانادا (۲۰۱۹) (۲۶)	۱۲ زن ورزشکار تغیری	۱±۲۳	ذکر نشده	۲۸۰ میلی لیتر آب چند روز (۲۶ میلی-مول NO_3^-) حاد و مزمن ۸ روز	عدم تأثیر بر اکسیژن مصرفی زیر بیشینه، افزایش تولید گشتاور فرکانس پاسین
۲۷	جاپکی و همکاران ^۵ هنگ کنگ (۲۰۲۴) (۲۷)	۱۳ زن ورزشکار تغیری	۱.۸±۲۲.۹	۱.۹±۲۱.۱	۶.۴ میلی-مول NO_3^- حاد ۱۲.۹ میلی-مول NO_3^- حاد	کاهش ضربان قلب و در فشار در طول انجام تمرين تناوبی با شدت بالا
۲۸	تاتلیسی ^۶ ترکیه (۲۰۲۱) (۲۸)	۸ کشته گیر تمرين کرده	۲.۳±۲۱.۸۷	ذکر نشده	۱۴۰ میلی لیتر آب چند روز حاد	افزایش گشتاور اوج در چرخانده‌های شان، افزایش میانگین قدرت ایزوکنتیک
۲۹	کردی و همکاران (۲۰۲۰) (۲۹)	۱۰ دختر جوان ورزشکار	۲.۵۹±۲۳.۴۰	۲.۲۱±۲۱.۹۲	۵۰۰ گرم چند روز (۲۰۰ میلی-گرم نیترات) حاد	کاهش معنی دار فشار خون سیستولیک قلل و بعد از آزمون، کاهش ضربان قلب حین آزمون، کاهش معنی دار در ک فشار در مسافت ۱۶ کیلومتر

^۱ - de Oliveira et al^۲ - de Almeida et al^۳ - Garnacho et al^۴ - Wickham et al^۵ - Jiaqi et al^۶ - tatlici

گلوتاتیون بستگی دارد (۳۶-۳۴). علاوه بر این، پروتئین‌های RyR حاوی مقدار قابل توجهی از گروه‌های سولفیدریل در مقایسه با سایر پروتئین‌های انقباضی هستند و این از این فرضیه پشتیبانی می‌کند که مدولاسیون RyR و آزادسازی NO با واسطه Ca^{+2} می‌تواند به افزایش انقباض عضلانی پس از مصرف NO_3^- کمک کند (۳۷). NO_3^- هزینه فسفات‌های پرانژری را در طی انقباض عضلات اسکلتی و تجمع داخل عضلانی آدنوزین دی فسفات (ADP) و فسفات را کاهش می‌دهد. عواملی که انتظار می‌رود گسترش خستگی در عضلات اسکلتی را کاهش دهند (۳۸، ۳۹). علاوه بر این، مکمل NO_3^- جریان خون عضلانی را افزایش می‌دهد (۴۰) و ممکن است به سنتز مجدد فسفوکراتین (PCr) بین نوبت‌های تمرین (۴۱) و بازیابی نیرو و عملکرد کمک کند (۴۲). مصرف آب چندر باعث افزایش جریان خون به اندامها و عضلات اسکلتی نوع تند انقباض می‌شود (۴۰). با توجه به این واقعیت که تأمین اکسیژن یک عامل محدود کننده در بازسازی عضله شود. در نهایت منجر به بهبود عملکرد در تمرین مقاومتی می‌شود (۴۵). علاوه بر قدرت عضلانی، بهبود استقامت عضلانی در طول تمرین مقاومتی می‌تواند به دلیل نقش NO باشد. زیرا در تنظیم فشار خون به وسیله گشاد کردن عروق و جلوگیری از انعقاد خون نقش دارد (۴۵). در مقابل صالح و همکاران (۲۰۲۰) با مطالعه ۱۲ دونده سرعت تمرین کرده، گزارش داد مصرف کپسول نیترات (۴۰.۴۶ میلی‌مول) ۶۰ دقیقه قبل از تمرین به صورت تک و هلهای تأثیری بر عملکرد سرعی دوندگان ندارد (۲). علت عدم مطابقت مطالعه صالح و همکاران با مطالعات فوق می‌توان به مصرف دوز پایین نیترات و فاصله زمانی کم مصرف آب چندر با تمرین اشاره کرد. مطالعات اثرات مثبت مکمل آب چندر بر توان هوایی ورزشکاران را گزارش کرده‌اند (۴۹، ۲۶، ۲۵، ۳۴). علت افزایش توان هوایی ناشی از مصرف BRJ می‌توان به این عامل اشاره کرد که نیترات پروتئین کیناز فعال شده با آدنوزین مونوفسفات حلقوی (AMPK) را فعال می‌کند. که عامل اصلی تنظیمی سازگاری متabolیسم اکسیدانتیو عضله اسکلتی است (۴۶). AMPK بیان و فسفوریل‌اسیون گیرنده فعال کننده تکثیر

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مصرف مکمل آب چندر (BRJ) بر برخی عوامل عملکردی در ورزشکاران انجام شد. در مورد تأثیر مکمل آب چندر بر قدرت و عملکرد عضلانی، خسروی و همکاران (۲۰۲۱) با مطالعه روی ۱۲ مرد تکواندو کار به این نتیجه رسیدند که مصرف ۱۴۰ میلی‌لیتر آب چندر ۱۲.۸ میلی-مول NO_3^- (NO₃⁻) به مدت ۶ ساعت افزایش اوج گشتاور بازکننده‌های زانو، افزایش سرعت زاویه‌ای، افزایش اوج قدرت عضلانی در انقباض ایزوکتیک، کاهش خستگی در طول انقباض می‌شود (۴۳). همچنین تاللیسی (۲۰۲۱) با مطالعه ۸ کشتی گیر تمرین کرده مصرف ۱۴۰ میلی‌لیتر آب چندر ربه صورت حد ساعت افزایش گشتاور اوج در چرخاننده‌های شانه، افزایش میانگین قدرت ایزوکتیک می‌شود (۵۳). علت افزایش قدرت و عملکرد عضلانی می‌تواند این مسئله باشد که NO_3^- می‌تواند عملکرد انقباضی را در عضله اسکلتی افزایش دهد، تنظیم پروتئین‌های انقباضی یا جابجایی Ca^{+2} در عضله اسکلتی پس از ترجمه است (۳۰). در واقع NO می‌تواند با تیول‌های پروتئینی^۱ به عنوان مثال، گروه‌های حاوی گروه‌های سولفیدریل، تیول پروتئین (RSH) یا آنیون تیولات (RS⁻) پاسخ دهد تا گروه‌های نیتروزوتیول (RSNO) را در یک فرآیند برگشت‌پذیر به نام S-nitrosylation تشکیل دهد (۳۱). S-nitrosylation ترکیب ساختار و در نتیجه عملکرد پروتئین‌ها را تغییر می‌دهند (۳۲). به عنوان مثال، واکنش NO با زنجیره‌های سنجین میوزین S-nitrosylate در عضلات اسکلتی گزارش شده است که باعث افزایش نیروی انقباضی می‌شود (۳۳). با توجه به اینکه پروتئین‌های مرتبط با انقباض می‌توانند به باقی مانده‌های سیستئین روی تیول‌ها مانند میوزین، تروپونین، شبکه سارکوآنولوپلاسمی (SR) انتقال کلسیم (SERCA)ATPase تبدیل شوند، اثر بالقوه S-nitrosylation بر روی فرآیند انقباض تحریک پیچیده است. و گیرنده‌های رایانودین (RyRs) دچار تغییرات برگشت ناپذیر شوند. این تغییرات پروتئین پس از ترجمه احتمالاً به برهمکنش بین NO، گونه‌های اکسیژن فعال (ROS) و فراهمی زیستی

¹ -protein thiols

ورزشی را افزایش می‌دهد (۵۴، ۵۵). علاوه بر این، باید توجه داشت که حفظ RPE پس از مصرف مکمل BRJ می‌تواند نتیجه کاهش فرمان موتور مرکزی به دلیل عملکرد انقباضی حفظ شده در طول تمرین باشد. زیرا RPE یک فرآیند بازخورد مرکزی را نشان می‌دهد که در آن یک پیام از نواحی حرکتی به ناحیه حسی مغز فرستاده می‌شود تا آگاهی از اقدامات مربوط به بازده حرکتی امکان پذیر باشد (۵۶). در طول انقباضات شدید، افزایش تدریجی RPE ممکن است نشان‌دهنده افزایش فرمان حرکتی مرکزی باشد که برای کاستی‌های ناشی از تمرین در عملکرد انقباضی عضلات لازم است تا اطمینان حاصل شود که توان خروجی کافی برای حفظ کار وجود دارد (۵۷). افزایش جریان خون مغز می‌تواند در کاهش RPE عضلانی و بهبود عملکرد پس از مصرف مکمل BRJ نقش داشته باشد (۵۸). از طرف دیگر میرآفتابی و همکاران (۲۰۲۳) با مطالعه ۱۲ تکواندوکار تمرین کرده، گزارش دادند مصرف $120\text{ میلی لیتر آب چغندر} (۸۰\text{ میلی-گرم NO}_3^-)$ به صورت حد، اثر معنی‌داری بر درک فشار ندارد (۳۸). تفاوت در دوز و مدت مکمل دهی ($15\text{ روز در مقابل مصرف تک و هله‌ای}$) می‌تواند علت تاهمسوبی با مطالعات فوق باشد.

BRJ منع اصلی ترکیبات آنتی اکسیدانی از جمله اسید اسکوربیک، کاروتونوئیدها، اسید فنولیک، فلاونوئیدها است (۵۹). برخی از مطالعات گزارش کرده اند که NO_2^- و NO_3^- برخی از مطالعات مکمل آب چغندر را دفع می‌کنند (۶۰). که این نشان دهنده اثرات آنتی اکسیدانی NO_3^- است (۶۱). بتالاین‌ها و بتانسین‌ها^۴ اجزای مکمل آب چغندر هستند که از آسیب DNA، پروتئین‌ها و چربی‌ها محافظت می‌کنند (۶۲). فعالیت بدنی باعث ایجاد استرس اکسایش می‌شود و مکمل دهی آب چغندر از شکل گیری رادیکال‌های آزاد جلوگیری می‌کند (۶۳). برای مثال سیناگا و همکاران (۲۰۲۰) نشان دادند مصرف $250\text{ میلی لیتر آب چغندر} (۲۰۲۰)$ می‌تواند اثراست را تحریک کند و کاهش شاخص استرس اکسایش (MDA) در دانشجویان تربیت بدنی می‌شود (۲۶).

گارناچو و همکاران (۲۰۲۰) با مطالعه ۱۲ مرد کراسفیت کار نشان دادند مصرف $140\text{ میلی لیتر آب چغندر} (12.8\text{ میلی مول NO}_3^-)$ به

پراسیزوم گاما ۱ آلفا^۱ (PGC-1α) را افزایش می‌دهد (۴۸، ۴۷). PGC-1α با کنترل بیان عامل تنفس هسته‌ای^۲ (NRF) و A هدف پایین دست آن، فاکتور رونویسی میتوکندری^۳ (TFAM) به عنوان یک تنظیم کننده متابولیک اصلی متابولیسم انرژی و بیوشتر میتوکندری عمل می‌کند (۴۹، ۵۰). مکمل NO_3^- یک راه موثر برای بهبود تولید NO، به نفع حجم خون بیشتر و در نتیجه اکسیژن است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ورزش به طور خاص منجر به یک محیط اسیدی و هایپوکسیک بدن شود. شرایطی که در آن کاهش متابولیسم NO_3^- فعالیت پیش ساز NO را افزایش می‌دهد (۵۱). تأمین اکسیژن بیشتر باعث تأخیر در شروع خستگی عضلانی در عملکرد ورزشی می‌شود و منجر به افزایش تولید انرژی به شکل ATP از طریق مسیرهای متابولیک هوایی می‌شود. در ورزش شدید و طولانی، تأخیر در شروع مسیرهای متابولیک بی‌هوایی منجر به افزایش مصرف اکسیژن می‌شود که برای تولید ATP مورد نیاز است (۵۲). در نتیجه، استفاده از NO_3^- می‌تواند عملکرد ورزشی را بهبود بخشد، زیرا نقش مثبتی در عملکرد عروقی دارد و اکسیژن بیشتری به عضلات می‌دهد، حداکثر اکسیژن مصرفی افراد را افزایش می‌دهد و مصرف اکسیژن در طول ورزش را کاهش می‌دهد. این موارد هزینه ATP را کاهش می‌دهد، اکسیژن رسانی به عضلات را افزایش می‌دهد و شروع خستگی عضلانی را به تأخیر می‌اندازد. در نتیجه کاهش مصرف اکسیژن و کاهش هزینه ATP باعث تأخیر در تولید لاکتات می‌شود (۵۲، ۵۳). مطالعات تأثیر مکمل آب چغندر بر درک فشار (RPE) را بررسی کرده اند (۵۴). برای مثال فرناندز و همکاران (۲۰۱۸) با مطالعه ۱۲ دونده نجفه استقامی گزارش دادند مصرف BRJ (۶.۵ میلی مول NO_3^- میلی لیتر) به مدت ۱۵ روز، باعث کاهش درک فشار می‌شود (۲۸). مکانیسم‌های احتمالی که ممکن است تأثیر BRJ بر روی RPE را توضیح دهد شامل افزایش جریان خون در لوب قدامی مغز است که کنترل حرکتی و تصمیم‌گیری را تنظیم می‌کند و به درک ذهنی تلاش کمک می‌کند و احتمالاً عملکرد

¹ - peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1 alpha

² - nuclear respiratory factor

³ - mitochondrial transcription factor

به نظر می‌رسد مکمل دهی نیترات اثر مطلوبی بر عملکرد تمرينی در ورزشکاران دارد. دوز مؤثر عملکرد و مزایای سلامتی در تحقیقاتی علمی NO_3^- تقریباً ۱۴۰ میلی‌لیتر آب چغندر (۱۲۸) میلی‌مول NO_3^- است. به منظور بهره مندی بیشتر از فواید مکمل، پیشنهاد می‌شود حداقل ۶ روز در دوز تعیین شده استفاده شود. همچنین، به نظر می‌رسد BRJ عملکرد را بدون هیچ گونه عوارض جانبی بهبود می‌بخشد.

تشکر و قدردانی

از تمامی استادی و دوستان عزیزی که ما را در انجام این مطالعه راهنمایی کردند، تشکر و قدردانی می‌کنیم.

تعارض منافع: بین نویسندها تنضاد منافع وجود ندارد.

منابع

- [1] Brooks G, Fahey T, Baldwin KM. Exercise Physiology: Human Bioenergetics and Its Application2005.
- [2] Noakes TD. Physiological models to understand exercise fatigue and the adaptations that predict or enhance athletic performance. Scand J Med Sci Sports.2000 . -45-123;(3)10.
- [3] Noordhof DA, Skiba PF, de Koning JJ. Determining anaerobic capacity in sporting activities. Int J Sports Physiol Perform. 2013;8(5):475-82.
- [4] Jones AM, Vanhatalo A. The 'Critical Power' Concept: Applications to Sports Performance with a Focus on Intermittent High-Intensity Exercise. Sports Med. 2017;47(Suppl 1):65-78.
- [5] Fijan A, Daryanoosh F, Kooroshfard N, Hosseinierezad F, Foroozan N, Mehrez A. The effect of creatine and sodium bicarbonate supplementation on anaerobic performance, fatigue index and futsal specific performance test in elite futsal players in pre-season training. Research in Exercise Nutrition. 2022;1(2):52-43.
- [6] Murphy M, Eliot K, Heuertz RM, Weiss E. Whole beetroot consumption acutely improves running performance. J Acad Nutr Diet. 2012;112(4):548-52.
- [7] Zamani H, de Joode M, Hossein IJ, Henckens NFT, Guggeis MA, Berends JE, et al. The benefits and risks of beetroot juice consumption: a systematic review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;61(5):788-804.

صورت حاد مقداری کورتیزول را افزایش می‌دهد (۵۰). گزارش شده است که NO یک پیام رسان بین سلولی و درون سلولی برای تنظیم برخی از عملکردهای سلولی، از جمله تغییرات در ترشح هورمون است (۶۵). پیشنهاد شده است که NO یکی از اصلی ترین واسطه‌های استرس درگیر در پاسخ حاد محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آдрنال^۱ (HPA) به ورزش است. تأثیر NO بر روی غده هیپوفیز و قشر آдрنال تأیید شده است (۶۶). گزارش شده است که ترشح کورتیزول می‌تواند مستقیماً توسط غلطت NO پس از تجویز تadalafil تحیریک شود (۶۷). فعال شدن محور HPA در حین ورزش باشد بالا در انسان باعث افزایش کورتیزول می‌شود (۶۸) که به عنوان یک هورمون متابولیک و کاتابولیک (۶۹)، در دسترس بودن همه سوبستراهای انرژی اعم از گلوكز (۷۱، ۷۰)، اسیدهای امینه و اسیدهای چرب آزاد را افزایش می‌دهد (۷۲). NO همچنین نقش کلیدی در هورمون‌های آتابولیک دارد. والنتی و همکاران^۲ (۷۳) نشان دادند که باعث ایجاد یک اثر دو فازی بر ترشح تستوسترون می‌شود که در سطوح بالاتر NO مهار کننده و در غلطت‌های کمتر NO تحیریک کننده بود. مانند NO، تستوسترون ممکن است اثر گشادکننده عروق را تحیریک کند (۷۴). با این حال، به نظر می‌رسد که تستوسترون در غلطت‌های بالاتر از ۱۰ میکرومول در لیتر باعث اتساع عروق می‌شود. اما در غلطت‌های فیزیولوژیکی پایین‌تر به نظر می‌رسد که NO در اثر گشادکننده عروق این هورمون دخیل است (۷۶).

NO باعث اتساع عروق می‌شود و درنتیجه فشار خون را کاهش می‌دهد (۷۷). کاهش فشار خون با افزایش حجم ضربه‌ای اجازه می‌دهد که بروند ده قلبی به حجم ضربه‌ای اتکا کند و اجازه می‌دهد که ضربان قلب در طول تمرين ثابت بماند یا کاهش یابد (۷۸). برای مثال بنجامیم و همکاران^۳ (۲۰۲۲) در یک مطالعه مروری نشان دادند مصرف ۳ الی ۶۰ روز مکمل آب چغندر به مقدار ۷۰ الی ۲۵۰ میلی‌لیتر باعث کاهش فشار خون سیستولی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون می‌شود (۷۹).

نتیجه‌گیری

¹ - hypothalamic-pituitary-adrenal

² - Valenti et al

³ - Benjamim et al

- properties of human skeletal muscle. *Med Sci Sports Exerc.* 2014;46(12):2234-43.
- [19] Forbes SPA, Spratt LL. Potential effect of beetroot juice supplementation on exercise economy in well-trained females. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2021;1:4.
- [20] Thompson KG, Turner L, Prichard J, Dodd F, Kennedy DO, Haskell C, et al. Influence of dietary nitrate supplementation on physiological and cognitive responses to incremental cycle exercise. *Respir Physiol Neurobiol.* 2014;193:11-20.
- [21] Thompson C, Wylie LJ, Fulford J, Kelly J, Black MI, McDonagh ST, et al. Dietary nitrate improves sprint performance and cognitive function during prolonged intermittent exercise. *Eur J Appl Physiol.* 2015;115(9):1825-34.
- [22] Hernández A, Schiffer TA, Ivarsson N, Cheng AJ, Bruton JD, Lundberg JO, et al. Dietary nitrate increases tetanic $[Ca^{2+}]_i$ and contractile force in mouse fast-twitch muscle. *J Physiol.* 2012;590:(15)83-3575.
- [23] Fulford J, Winyard PG, Vanhatalo A, Bailey SJ, Blackwell JR, Jones AM. Influence of dietary nitrate supplementation on human skeletal muscle metabolism and force production during maximum voluntary contractions. *Pflugers Arch.* 2013;465 :(4)517-28.
- [24] Gilchrist M, Winyard PG, Fulford J, Anning C, Shore AC, Benjamin N. Dietary nitrate supplementation improves reaction time in type 2 diabetes: development and application of a novel nitrate-depleted beetroot juice placebo. *Nitric Oxide.* 2014;74-40:67.
- [25] El Gamal AA, AlSaid MS, Raish M, Al-Sohaibani M, Al-Massarani SM, Ahmad A, et al. Beetroot (*Beta vulgaris* L.) extract ameliorates gentamicin-induced nephrotoxicity associated oxidative stress, inflammation, and apoptosis in rodent model. *Mediators Inflamm.* 2014;2014:983952.
- [26] Sinaga F, Sinaga R. Impact of supplementation with beetroot juice (*Beta vulgaris* L) on levels of malondialdehyde and antioxidant status in athletes. *Pharmaciana.* 2020;10:305.
- [27] M SSNFb. THE EFFECT OF BEETROOT SUPPLEMENT ON SPRINTING PERFORMANCE. *Malaysian Journal of Sport Science and Recreation.* 2020;16(2):96-105.
- [28] Conger SA, Zamzow CM, Darnell ME. Acute Beet Juice Supplementation Does Not Improve 30- or 60-second Maximal [8] Duncan C, Dougall H, Johnston P, Green S, Brogan R, Leifert C, et al. Chemical generation of nitric oxide in the mouth from the enterosalivary circulation of dietary nitrate. *Nat Med.* 1995;1(6):546-51.
- [9] Lundberg JO, Govoni M. Inorganic nitrate is a possible source for systemic generation of nitric oxide. *Free Radic Biol Med.* 2004;37(3):395-400.
- [10] Pawlak-Chaouch M, Boissière J, Munyaneza D, Gamelin FX, Cuvelier G, Berthoin S, Aucouturier J. Beetroot Juice Does Not Enhance Supramaximal Intermittent Exercise Performance in Elite Endurance Athletes. *J Am Coll Nutr.* 2019;38(8):729-38.
- [11] Domínguez R, Cuenca E, Maté-Muñoz JL, García-Fernández P, Serra-Paya N, Estevan MC, et al. Effects of Beetroot Juice Supplementation on Cardiorespiratory Endurance in Athletes. A Systematic Review. *Nutrients.* 2017;9(1).
- [12] McMahon NF, Leveritt MD, Pavey TG. The Effect of Dietary Nitrate Supplementation on Endurance Exercise Performance in Healthy Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Med.* 2017;47(4):735-56.
- [13] Williams TD, Martin MP, Mintz JA, Rogers RR, Ballmann CG. Effect of Acute Beetroot Juice Supplementation on Bench Press Power, Velocity, and Repetition Volume. *J Strength Cond Res.* 2020;34(4):924-8.
- [14] Domínguez R, Maté-Muñoz JL, Cuenca E, García-Fernández P, Mata-Ordoñez F, Lozano-Esteve MC, et al. Effects of beetroot juice supplementation on intermittent high-intensity exercise efforts. *J Int Soc Sports Nutr.* 2018;15:2.
- [15] Bailey SJ, Fulford J, Vanhatalo A, Winyard PG, Blackwell JR, DiMenna FJ, et al. Dietary nitrate supplementation enhances muscle contractile efficiency during knee-extensor exercise in humans. *J Appl Physiol (1985).* 2010;109(1):135-48.
- [16] Jodra P, Domínguez R, Sánchez-Olivier AJ, Veiga-Herreros P, Bailey SJ. Effect of Beetroot Juice Supplementation on Mood, Perceived Exertion, and Performance During a 30-Second Wingate Test. *Int J Sports Physiol Perform.* 2020;15(2):243-8.
- [17] Casado A, Domínguez R, Silva S, Bailey S. Influence of Sex and Acute Beetroot Juice Supplementation on 2 KM Running Performance. *Applied Sciences.* 2021;11:1-10.
- [18] Haider G, Folland JP. Nitrate supplementation enhances the contractile

- Exercise Performance in Experienced CrossFit Athletes. *Food/Nutrition Science; Education; Management; Food Services/Culinary; ResearchH.* 2018;118:10.
- [38] Miraftabi H ,Akbar Nejad A, soori r, Berjisian E. The effect of acute ingestion of beetroot juice supplement on taekwondo-related performance during a simulated match. *Sport Physiology & Management Investigations.* 2023;15(2):67-77.
- [39] Afsharnezhad T, Fazeli Sani A .Effects of a Single Dose of Beetroot Juice on Functional and Cardiovascular Changes Following Acute Resistance Training in Men with Hypertension. *Avicenna Journal of Clinical Medicine.* 2021;28(3):176-85.
- [40] Jurado-Castro JM, Campos-Perez J, Ranchal-Sanchez A, Durán-López N, Domínguez R. Acute Effects of Beetroot Juice Supplements on Lower-Body Strength in Female Athletes: Double-Blind Crossover Randomized Trial. *Sports Health.* 2022;14(6):812-21.
- [41] Kent GL, Dawson B, McNaughton LR, Cox GR, Burke LM, Peeling P. The effect of beetroot juice supplementation on repeat-sprint performance in hypoxia. *J Sports Sci.* 2019;37(3):339-46.
- [42] de Castro TF, Manoel FA, Figueiredo DH, Figueiredo DH, Machado FA. Effect of beetroot juice supplementation on 10-km performance in recreational runners. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2019;44(1):90-4.
- [43] Khosravi S, Ahmadizad S, Yekaninejad MS, Karami MR, Djafarian K. The effect of beetroot juice supplementation on muscle performance during isokinetic knee extensions in male Taekwondo athletes. *Science & Sports.* 2021;36(6):483.e1-e7.
- [44] Jodra P, Domínguez R, Sanchez-Oliver A, Herreros P, Bailey S. Effect of Beetroot Juice Supplementation on Mood, Perceived Exertion and Performance During a 30 s Wingate Test. *International journal of sports physiology and performance.* 2019;15:1-20.
- [45] Azali Alamdari K, Babaei Khooinaroud M, Fakhrpour R. The effect of plyometric exercises and beetroot extract supplementation on anaerobic power, nitric oxide, lactate and blood pH following intensive anaerobic activity in football players. *Research in Exercise Nutrition.* 2023;2(1):65-53.
- [46] Hashemi fard Es, Ebrahimi M. The effect of acute consumption of red beet juice on aerobic and anaerobic power of amateur karate girls. *Journal of Sport and Exercise Physiology.* 2022;15(3):102-11.
- Intensity Performance in Anaerobically Trained Athletes. *Int J Exerc Sci.* 2021;14(2):60-75.
- [29] Balsalobre-Fernández C, Romero-Moraleda B, Cupeiro R, Peinado A, Butragueño J, Benito PJ. The effects of beetroot juice supplementation on exercise economy, rating of perceived exertion and running mechanics in elite distance runners: A double-blinded, randomized study. *PLOS ONE.* 2018;13:e0200517.
- [30] Hassanpour N, ghanbarpour a, Pourvaghar MJ, Khalafi M. The effect of different doses of acute consumption of beet juice supplement on anaerobic performance in trained individual. *Metabolism and Exercise.* 2022;12(1):89-107.
- [31] khosravaniyan n, mosallanezhad z, moghadasi m, bashafaat h. Effect of ischemic preconditioning and beetroot supplementation on anaerobic performance of man cyclists. *Metabolism and Exercise.* 2023;13(1):117-31.
- [32] Cuenca E, Jodra P, Pérez-López A, González-Rodríguez LG, Fernandes da Silva S, Veiga-Herreros P, Domínguez R. Effects of Beetroot Juice Supplementation on Performance and Fatigue in a 30-s All-Out Sprint Exercise: A Randomized, Double-Blind Cross-Over Study. *Nutrients.* 2018;10(9).
- [33] Hemmatinafar M, Zaremoayedi L, Koushkie Jahromi M, Alvarez-Alvarado S, Wong A, Niknam A, et al. Effect of Beetroot Juice Supplementation on Muscle Soreness and Performance Recovery after Exercise-Induced Muscle Damage in Female Volleyball Players. *Nutrients.* 2023;15(17).
- [34] Behrens CE, Jr., Ahmed K, Ricart K, Linder B, Fernández J, Bertrand B, et al. Acute beetroot juice supplementation improves exercise tolerance and cycling efficiency in adults with obesity. *Physiol Rep.* 2020;8(19):e14574.
- [35] Vaccaro MG, Innocenti B, Cione E, Gallelli L, De Sarro G, Bonilla DA, Cannataro R. Acute effects of a chewable beetroot-based supplement on cognitive performance: a double-blind randomized placebo-controlled crossover clinical trial. *Eur J Nutr.* 2024;63(1):303-21.
- [36] Wylie LJ, Bailey SJ, Kelly J, Blackwell JR, Vanhatalo A, Jones AM. Influence of beetroot juice supplementation on intermittent exercise performance. *Eur J Appl Physiol.* 2016;116(2):41.25-5.
- [37] S. Frick JM, A. Landry, M. Harris. The Effects of Beetroot Supplementation on

- Sodium nitrate ingestion increases skeletal muscle nitrate content in humans. *J Appl Physiol* (1985). 2017;123(3):637-44.
- [56] Stamler JS, Meissner G. Physiology of nitric oxide in skeletal muscle. *Physiol Rev*. 2001;81(1):209-37.
- [57] Stamler JS. Redox signaling: nitrosylation and related target interactions of nitric oxide. *Cell*. 1994;78(6):931-6.
- [58] Evangelista AM, Rao VS, Filo AR, Marozkina NV, Doctor A, Jones DR, et al. Direct regulation of striated muscle myosins by nitric oxide and endogenous nitrosothiols. *PLoS One*. 2010;5(6):e11209.
- [59] Eu JP, Sun J, Xu L, Stamler JS, Meissner G. The skeletal muscle calcium release channel: coupled O₂ sensor and NO signaling functions. *Cell*. 2000;102(4):499-509.
- [60] Stoyanovsky D, Murphy T, Anno PR, Kim YM, Salama G. Nitric oxide activates skeletal and cardiac ryanodine receptors. *Cell Calcium*. 1997;21(1):19-29.
- [61] Gould N, Doulias PT, Tenopoulou M, Raju K, Ischiropoulos H. Regulation of protein function and signaling by reversible cysteine S-nitrosylation. *J Biol Chem*. 2013;288(37):26473-9.
- [62] Coggan AR, Broadstreet SR, Mikhalkova D, Bole I, Leibowitz JL, Kadkhodayan A, et al. Dietary nitrate-induced increases in human muscle power: high versus low responders. *Physiol Rep*. 2018;6(2).
- [63] Allen DG, Lamb GD, Westerblad H. Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms. *Physiol Rev*. 2008;88(1):287-332.
- [64] Ferguson SK, Hirai DM, Copp SW, Holdsworth CT, Allen JD, Jones AM, et al. Impact of dietary nitrate supplementation via beetroot juice on exercising muscle vascular control in rats. *J Physiol*. 57-547;(2)591:2013.
- [65] Vanhatalo A, Fulford J, Bailey SJ, Blackwell JR, Winyard PG, Jones AM. Dietary nitrate reduces muscle metabolic perturbation and improves exercise tolerance in hypoxia. *J Physiol*. 2011;589(Pt 22):5517-28.
- [66] Bogdanis GC, Nevill ME, Boobis LH, Lakomy HK. Contribution of phosphocreatine and aerobic metabolism to energy supply during repeated sprint exercise. *J Appl Physiol* (1985). 1996;80(3):876-84.
- [67] Kamga Pride C, Mo L, Quesnelle K, Dagda RK, Murillo D, Geary L, et al. Nitrite activates protein kinase A in normoxia to
- [47] Hemmatinafar M, Mosallanezhad Z, Abdollahei MH, Yazdani H, Samsami Pour A, Kooshfard N, Hanani M. Beetroot Juice Supplementation Improves Fatigue, Aerobic, Anaerobic Performance and Nitrite concentration In College Soccer Players. *Razi Journal of Medical Sciences*. 2021;28(2):81-92.
- [48] de Oliveira GV, do Nascimento LAD, Volino-Souza M, do Couto Vellozo O, Alvares TS. A single oral dose of beetroot-based gel does not improve muscle oxygenation parameters, but speeds up handgrip isometric strength recovery in recreational combat sports athletes. *Biol Sport*. 2020;37(1):93-9.
- [49] de Almeida N, Santos D, Costa K, Fernandes J, Queiroz A, Valenzuela Perez D, et al. Beetroot extract improves specific performance and oxygen uptake in taekwondo athletes: A double-blind crossover study. *Ido Movement for Culture*. 2021;21:12-9.
- [50] Garnacho-Castaño MV, Palau-Salvà G, Serra-Payá N, Ruiz-Hermosel M, Berbell M, Viñals X, et al. Understanding the effects of beetroot juice intake on CrossFit performance by assessing hormonal, metabolic and mechanical response: a randomized, double-blind, crossover design. *J Int Soc Sports Nutr*. 2020;17(1):56.
- [51] Wickham KA, McCarthy DG, Pereira JM, Cervone DT, Verdijk LB, van Loon LJC, et al. No effect of beetroot juice supplementation on exercise economy and performance in recreationally active females despite increased torque production. *Physiol Rep*. 2019;7(2):e13982.
- [52] Jiaqi Z, Zihan D, Heung-Sang Wong S, Chen Z, Tsz-Chun Poon E. Acute effects of various doses of nitrate-rich beetroot juice on high-intensity interval exercise responses in women: a randomized, double-blinded, placebo-controlled, crossover trial. *J Int Soc Sports Nutr*. 2024;21(1):2334680.
- [53] tatlıcı A. The effects of acute beetroot juice supplementation on lower and upper body isokinetic strength of the wrestlers. *Journal of Men's Health*. 2021;17:249-54.
- [54] Kordi MR, Salimi Nahrolduz M, hooshmand moghadam b. The effects of beetroot consumption on blood pressure, heart rate ,perceived exertion and the speed of running in young female athletes. *Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences*. 2020;25(4):79-92.
- [55] Nyakayiru J, Kouw IWK, Cermak NM, Senden JM, van Loon LJC, Verdijk LB.

- neural pathways. *Trends Neurosci.* 2007;30:14-21.
- [79] Husmann F, Bruhn S, Mittlmeier T, Zschorlich V, Behrens M. Dietary Nitrate Supplementation Improves Exercise Tolerance by Reducing Muscle Fatigue and Perceptual Responses. *Front Physiol.* 2019;10:404.
- [80] de Morree HM, Klein C, Marcora SM. Perception of effort reflects central motor command during movement execution. *Psychophysiology.* 2012;49(9):1:153-242
- [81] Georgiev VG, Weber J, Kneschke EM, Denev PN, Bley T, Pavlov AI. Antioxidant activity and phenolic content of betalain extracts from intact plants and hairy root cultures of the red beetroot Beta vulgaris cv. Detroit dark red. *Plant Foods Hum Nutr.* 2010;65(2):105-11.
- [82] Woottton-Beard P, Ryan L. A beetroot juice shot is a significant and convenient source of bioaccessible antioxidants. *Journal of Functional Foods.* 2011;3:329-34.
- [83] Lundberg JO, Carlström M, Larsen FJ, Weitzberg E. Roles of dietary inorganic nitrate in cardiovascular health and disease. *Cardiovasc Res.* 2011;89(3):525-32.
- [84] Wink DA, Hines HB, Cheng RY, Switzer CH, Flores-Santana W, Vitek MP, et al. Nitric oxide and redox mechanisms in the immune response. *J Leukoc Biol.* 2011; 891-873;(6):9.
- [85] Kujawska M, Ignatowicz E, Murias M, Ewertowska M, Mikołajczyk-Bator K, Jodynisi-Liebert J. Protective Effect of Red Beetroot against Carbon Tetrachloride- and N -Nitrosodiethylamine-Induced Oxidative Stress in Rats. *Journal of agricultural and food chemistry.* 2009;57:2570-5.
- [86] Woottton-Beard P, Moran A, Ryan L. Stability of the total antioxidant capacity and total polyphenol content of 23 commercially available vegetable juices before and after in vitro digestion measured by FRAP, DPPH, ABTS and Folin-Ciocalteu methods. *Food Research International.* 2011;44:217-24.
- [87] Rettori V, Belova N, Dees WL, Nyberg CL, Gimeno M, McCann SM. Role of nitric oxide in the control of luteinizing hormone-releasing hormone release in vivo and in vitro. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 1993;90(21):10130-4.
- [88] Lowenstein CJ, Dinerman JL, Snyder SH. Nitric oxide: a physiologic messenger. *Ann Intern Med.* 1994;120(3):227-37.
- [89] Tsuchiya T, Kishimoto J, Koyama J, Ozawa T. Modulatory effect of L-NAME, a specific mediator mitochondrial fusion and tolerance to ischaemia/reperfusion. *Cardiovasc Res.* 2014;101(1):57-68.
- [68] Fu WJ, Haynes TE, Kohli R, Hu J, Shi W, Spencer TE, et al. Dietary L-arginine supplementation reduces fat mass in Zucker diabetic fatty rats. *J Nutr.* 2005;135(4):714-21.
- [69] Lira VA, Brown DL, Lira AK, Kavazis AN, Soltow QA, Zeanah EH, Criswell DS. Nitric oxide and AMPK cooperatively regulate PGC-1 in skeletal muscle cells. *J Physiol.* 2010;588(Pt 18):3551-66.
- [70] Boström P, Wu J, Jedrychowski MP, Korde A, Ye L, Lo JC, et al. A PGC1- α -dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat and thermogenesis. *Nature.* 2012;481(7382):463-8.
- [71] Wu Z, Puigserver P, Andersson U, Zhang C, Adelmant G, Mootha V, et al. Mechanisms controlling mitochondrial biogenesis and respiration through the thermogenic coactivator PGC-1. *Cell.* 1999;98(1):115-24.
- [72] McMahon S, Jenkins D. Factors affecting the rate of phosphocreatine resynthesis following intense exercise. *Sports Med.* 2002;32(12):761-84.
- [73] Siervo M, Lara J, Ogbomwan I, Mathers JC. Inorganic nitrate and beetroot juice supplementation reduces blood pressure in adults: a systematic review and meta-analysis. *J Nutr.* 2013;143(6):818-26.
- [74] Ranchal-Sanchez A, Diaz-Bernier VM, De La Florida-Villagran CA, Llorente-Cantarero FJ, Campos-Perez J, Jurado-Castro JM. Acute Effects of Beetroot Juice Supplements on Resistance Training: A Randomized Double-Blind Crossover. *Nutrients.* 2020;12(7).
- [75] Hoon MW, Jones AM, Johnson NA, Blackwell JR, Broad EM, Lundy B, et al. The effect of variable doses of inorganic nitrate-rich beetroot juice on simulated 2,000-m rowing performance in trained athletes. *Int J Sports Physiol Perform.* 2014;9(4):615-20.
- [76] Martí JG MA, Bosch MP, Cid AV, Ferrari MR. El efecto del zumo de remolacha sobre la presión arterial y el ejercicio físico: revisión sistemática Rev Esp Nutr Com. 2015;21:20-9.
- [77] Jones AM. Dietary nitrate supplementation and exercise performance. *Sports Med.* 2014;44 Suppl 1(Suppl 1):S35-45.
- [78] Poulet JFA HB. . New insights into corollary discharges mediated by identified

- The non-genomic point of view. *J Steroid Biochem Mol Biol.* 2020;196 :105496.
- [100] Satyanand V, Shaik MV, PhaniKrishna B, Dhanalakshmi.Narayanasamy, Lilly N, Shaik.Mujeer, Shaik.Salma. A study of beet root derived dietary nitrate efficacy on performance of runners. *Indian Journal of Basic and Applied Medical Research.* 2014.;5-3:690
- [101] Jajja A, Sutyarjoko A, Lara J, Rennie K, Brandt K, Qadir O, Siervo M. Beetroot supplementation lowers daily systolic blood pressure in older, overweight subjects. *Nutr Res.* 2014;34(10):868-75.
- [102] Benjamim CJR, Porto AA, Valenti VE, Sobrinho A, Garner DM, Gualano B, Bueno Júnior CR. Nitrate Derived From Beetroot Juice Lowers Blood Pressure in Patients With Arterial Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Nutr.* 2022;9:823039.
- [103] Yuste JE, Tarragon E, Campuzano CM, Ros-Bernal F. Implications of glial nitric oxide in neurodegenerative diseases. *Front Cell Neurosci.* 2015;9:322.
- nitric oxide synthase (NOS) inhibitor, on stress-induced changes in plasma adrenocorticotropic hormone (ACTH) and corticosterone levels in rats: physiological significance of stress-induced NOS activation in hypothalamic-pituitary-adrenal axis. *Brain Res.* 1997.- :74-68;(1-2)776:74
- [90] Di Luigi L, Baldari C, Sgrò P, Emerenziani GP, Gallotta MC, Bianchini S, et al. The type 5 phosphodiesterase inhibitor tadalafil influences salivary cortisol, testosterone, and dehydroepiandrosterone sulphate responses to maximal exercise in healthy men. *J Clin Endocrinol Metab.* 2008;93(9):3510-4.
- [91] VanBruggen MD, Hackney AC, McMurray RG, Ondrak KS. The relationship between serum and salivary cortisol levels in response to different intensities of exercise. *Int J Sports Physiol Perform.* 2011;6(3):396-407.
- [92] Arlt W, Stewart PM. Adrenal corticosteroid biosynthesis, metabolism, and action. *Endocrinol Metab Clin North Am.* 2005;34(2):293-313, viii.
- [93] Rizza RA, Mandarino LJ, Gerich JE. Cortisol-induced insulin resistance in man: impaired suppression of glucose production and stimulation of glucose utilization due to a postreceptor defect of insulin action. *J Clin Endocrinol Metab.* 1982;54(1):131-8.
- [94] Dinneen S, Alzaid A, Miles J, Rizza R. Metabolic effects of the nocturnal rise in cortisol on carbohydrate metabolism in normal humans. *J Clin Invest.* 1993;92(5):2283-90.
- [95] Djurhuus CB, Gravholt CH, Nielsen S, Mengel A, Christiansen JS, Schmitz OE, Møller N. Effects of cortisol on lipolysis and regional interstitial glycerol levels in humans. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* 2002;283(1):E172-7.
- [96] Valenti S, Cuttica CM, Fazzuoli L, Giordano G, Giusti M. Biphasic effect of nitric oxide on testosterone and cyclic GMP production by purified rat Leydig cells cultured in vitro. *Int J Androl.* 41-336;(5)22:1999.
- [97] Yildiz O, Seyrek M, Gul H, Un I, Yildirim V, Ozal E, et al. Testosterone relaxes human internal mammary artery in vitro. *J Cardiovasc Pharmacol.* 2005;45(6):580-5.
- [98] Han DH, Chae MR, Jung JH, So I, Park JK, Lee SW. Effect of testosterone on potassium channel opening in human corporal smooth muscle cells. *J Sex Med.* 2008;5(4):822-32.
- [99] Lorigo M, Mariana M, Lemos MC, Cairrao E. Vascular mechanisms of testosterone: